N°. 49

Observation sur une hernie avec etranglement a la partie inferieure du sac

Le 29 juillet 1764. j'ouvris le cadavre d'un homme âgé de 60 ans fort gros, et qui avoit deux hernies ingeunalles, dont il etoit mort, les bourses etoient très tumefiées et pretes a tomber en gangrene. le dartos etoit infiltré, les deux sacs herniaires n'etoient presque point adherents au tremaster ce qui pouvoit venir de l'infiltration. ils s'avancoient le long des cordons spermatique, presque jusque sur les testicules. le gauche plus que le droit. ils etoient tous deux gros chacun comme une bouteille de chopine, le gauche etoit plus gros que le droit, et etoit etranglé a la partie inferieure comme si il i avoit eu une ligature, de maniere qu'il formoit deux poches qui ne communiquoient que par une ouverture a laisser passer le petit doigt, cette hernie etoit une epiplocele, et quoi que l'epiploon fut bien nourri il etoit reduit a l'endroit de cet etranglement en une simple membrane adherente au sac dans cet endroit seulement.

a l'egard de la hernie du coté droit elle n'etoit point etranglée, et elle etoit formée par la fin de l'illeum qui etoit un peu rouge et gonflé de vent. mais il n'i avoit point d'adherence.

j'ai fait voire cette piece a M.r louis et M.r coutavoz, parceque je n'avois pas encore vû d'etranglement de cette nature quoi que je disseque tous les herniers qui meurent ici

ARC 15 d. 47

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE